

GUIA PRACTICA PARA LA UTILIZACION DE ANTIBIOTICOS DE ALTO COSTO.

Con el objetivo de promover el uso racional de antibióticos a continuación, se detallan aspectos para tener en cuenta a partir de la notificación de las presentes.

- Considerar tratamiento empírico inicial por el lapso de 48-72 horas dependiendo de los tipos de equipos de cultivos (automatizados o no) con los que cuentan los distintos prestadores.
- Proponer y que sea excluyente, que ante cultivos positivos con opciones terapéuticas no catástrofe, se descalone el tratamiento antibiótico, otorgándose como máximo 48-72 horas de tratamiento empírico inicial.
- Acordar que los tratamientos indicados en pacientes con shock séptico sin foco definido sean acotados a 7-10 días y siempre con evolución infectológica favorable, de lo contrario deberá suspenderse dentro de las 72 hs. de iniciado el tratamiento.
- Proponer y que sea excluyente para la autorización de antimicrobianos, la intervención de especialista en infectología en la prescripción de los mismos cuando los cultivos sean negativos esté el paciente en piso o en unidad de cuidados críticos y siempre que el paciente amerite continuar con tratamiento y quedando sujeto a la evaluación por nuestra auditoria.
- Evaluar tratamientos en pacientes con características particulares como neutropénicos, presencia de gérmenes multirresistentes, internaciones previas, pacientes institucionalizados, etc. Como así también evaluar las dosis de tratamientos en infecciones graves.

GERENCIA PRESTACIONAL.

Paraná, 19 de noviembre de 2024.

Dr. Yazda Omar Mohamed
Gerente Prestacional
I.O.S.P.E.R